



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E INFORMÁTICA

MATEMÁTICA DISCRETA – 2011.2

Prof. Marcelo Gama

1ª LISTA DE EXERCÍCIOS

Cálculo proposicional

- Um estudante (muito) desatento utilizou conectivos de forma errada para escrever as proposições a seguir. Escreva corretamente cada uma dessas proposições (pode haver mais de uma forma correta):
 - $x \neg < y$
 - $0 < x \wedge y$
 - $x > 0 \neg \rightarrow x > 1$
 - $x \neg = 0 \rightarrow x^2 \neg = 0$
- Quais das sentenças a seguir são proposições e quais não são?
 - Mouse pode ser um animal ou um acessório para computadores.
 - Você volta logo?
 - Não sei porque você não gosta de estudar.
 - Quem não tem pecado atire a primeira pedra!
- Para cada proposição a seguir, encontre as proposições atômicas P, Q, R, \dots . Em seguida, escreva cada uma utilizando a linguagem simbólica da lógica proposicional, observando o emprego correto dos conectivos.
 - Não é o caso que se está chovendo então está nevando.
 - Se não está chovendo, então não é o caso que está nevando e chovendo.
 - Para que eu vá ao cinema basta que não chova.
 - Vou à praia, com ou sem chuva.
- Reescrever as proposições a seguir utilizando a linguagem simbólica da lógica proposicional:
 - Ou $x^2 + y^2 > 0$ ou tem-se simultaneamente $x = 0$ e $y = 0$.
 - O número x é maior que pelo menos um dos números y ou z .
 - $3x = 6$ quando $2x = 4$.
 - A raiz quadrada de um número x é positiva, quer ele seja positivo, quer ele seja negativo.

5. Considere as seguintes proposições:

$$A : \text{“Ana vai”} \quad B : \text{“Bia vai”} \quad C : \text{“Carla vai”} \quad D : \text{“Dany vai”}$$

Escreva em linguagem simbólica as proposições a seguir:

- (a) Ana vai somente se Carla vai.
- (b) Carla não vai, mas Bia e Dany vão.
- (c) Se nem Ana nem Dany vão, então Carla vai.
- (d) Se Ana vai, então Dany ou Bia vai, e se Ana não vai, então Bia e Carla vão.

6. Determinar o valor lógico de cada uma das proposições abaixo:

- (a) Os carros são todos azuis e se não é verdade que Lula é o presidente do Brasil, então a Capital de Pernambuco é Olinda.
- (b) Brasil tem sete letras quando $2 + 2 = 3$
- (c) Se não é verdade que $\sqrt{16} = 3$, então $2 < 7$ se, e somente se, $1 \neq 0$.
- (d) $(\neg\sqrt{2} < 0 \wedge \cos 45^\circ = 1) \leftrightarrow \neg(\sqrt{2} \geq 0 \vee \neg(1 + 1 = 3))$

7. Marcos, Paulo e Roberto são três políticos suspeitos de participarem de uma fraude. Quando interrogados sobre o fato, afirmaram:

- ◆ Marcos: Paulo participou, mas Roberto não.
- ◆ Paulo: Se Marcos não participou, então Roberto também não participou.
- ◆ Roberto: Eu não participei mas, pelo menos um dos outros dois não participou.

Baseado nessas informações, responda às seguintes questões:

- (a) Supondo que os três depoimentos são verdadeiros, descubra quem participou da fraude.
- (b) Caso os três tenham participado da fraude, quem está mentindo e quem fala a verdade?

8. Prove, usando tabelas-verdade, **apenas quatro** das seguintes equivalências lógicas especiais:

- (a) Dupla negação: $\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$
- (b) Idempotência conjuntiva: $P \wedge P \Leftrightarrow P$
- (c) Idempotência disjuntiva: $P \vee P \Leftrightarrow P$
- (d) Comutatividade da conjunção: $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$
- (e) Comutatividade da disjunção: $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$
- (f) Associatividade da conjunção: $(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$
- (g) Associatividade da disjunção: $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$
- (h) Distributividade da conjunção em relação à disjunção: $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
- (i) Distributividade da disjunção em relação à conjunção: $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
- (j) Lei de Morgan 1 : $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

- (k) Lei de Morgan 2: $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$
- (l) Lei da condicional: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$
- (m) Lei da bicondicional 1: $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- (n) Lei da bicondicional 2: $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
- (o) Lei da contraposição: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$
- (p) Lei da absorção: $P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P \rightarrow Q$
- (q) Lei de Clavius: $\neg P \rightarrow P \Leftrightarrow P$
- (r) Lei do dilema: $(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$
- (s) Lei da refutação por absurdo: $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) \Leftrightarrow \neg P$
- (t) Lei da demonstração por absurdo: $(P \wedge \neg Q) \rightarrow R \Leftrightarrow P \rightarrow Q$ (onde R é uma contradição)

Quantificadores

9. Interprete cada uma das fórmulas abaixo e descreva a interpretação em português:

- ◆ $A(x) : x$ é aluno do BSI.
- ◆ $M(x) : x$ estuda matemática discreta.
- ◆ $P(x) : x$ estuda programação.

- (a) $(\forall x)(A(x) \wedge M(x) \rightarrow \neg P(x))$
- (b) $(\exists x)(A(x) \wedge M(x) \wedge P(x))$
- (c) $\neg(\exists x)(A(x) \wedge \neg E(x) \wedge \neg P(x))$
- (d) $(\forall x)(M(x) \vee P(x) \rightarrow A(x))$

10. São dados os seguintes predicados:

- ◆ $P(x, y) : x$ é pai de y .
- ◆ $M(x, y) : x$ é mãe de y .
- ◆ $C(x, y) : x$ é casado (ou casada) com y .

Usando esses predicados e quantificadores apropriadamente escolhidos, escreva **apenas seis** das declarações a seguir como fbf's. (Tome o conjunto universo como sendo o conjunto de todas pessoas do mundo.)

- (a) *Carla* é avó de *Beto*.
- (b) x é filho de y .
- (c) x é irmão de y .
- (d) x é tia de y .
- (e) x é primo de y .
- (f) x é tia de y .
- (g) x é sogro de y .

- (h) x é nora de y .
- (i) x é cunhado de y .
- (j) x é pai de um filho fora do casamento.
- (k) Todos os filhos e filhas de x já tem filhos.

Métodos de prova (identificar o método utilizado)

11. Prove que a equação $x^2 + y^2 = 6$ não tem solução inteira.
12. Prove que nem todo número da forma $2^n - 1$, com $n \in \mathbb{N} - \{0\}$, é primo.
13. Prove que se n é um inteiro ímpar, então n^2 deixa resto 1 na divisão por 4.
14. Prove que se a e b são inteiros e $a \cdot b$ é ímpar, então a e b são ímpares.
15. Sejam $a, b \in \mathbb{N}$. Prove que $a + b$ é par se, e somente se, a e b são ambos pares ou ambos ímpares.